

# R-THP-COP 療法

～ 治療スケジュール ～

1日目

① リツキサンの前投薬  
スルピリン注 250mg  
水溶性プレドニン 100mg  
生理食塩液 50mL

↓ 15分

② リツキシマブBS 375mg/m<sup>2</sup>  
生理食塩液

↓ 約 時間 (徐々に早く点滴します。)

③ グラニセトロン点滴静注液3mg

↓ 30分

④ ピンクリスチン 1.4mg/m<sup>2</sup> (Max2mg)  
生理食塩液 50mL

↓ 15分

⑤ ピラルピシン 50mg/m<sup>2</sup>  
5%ブドウ糖液 100mL

↓ 30分

⑥ シクロホスファミド注 750mg/m<sup>2</sup>  
炭酸水素ナトリウム注 20mL  
生理食塩液 500mL

↓ 2時間

⑦ 生理食塩液

2～5日目

内服薬 プレドニン錠 5mg・・・ステロイドです。


◆飲み方◆

朝食後 ( ) 錠 昼食後 ( ) 錠



# R-THP-COP 療法

## R-THP-COP 療法の投与スケジュール



R-THP-COP 療法は  
3週間ごとに  
上記のお薬を使用します。  
これを1コースとし、患者さま  
の状態に合わせて何コースか  
繰り返します。