

SIRB 療法

～ 治療スケジュール ～

- ・ アプレピタントカプセル125mg
(点滴が始まる1時間以上前に内服)



- ① 生理食塩液・・・点滴のルートをキープします。

↓ 15分

- ③ ベバシズマブ 7.5mg/kg
生理食塩液 100mL

↓ 30～90分 (初回は90分、2回目以降は1時間で滴下可、3回目以降は30分で滴下可)

- ② パロノセトロン静注 0.75mg
デキサメタゾン注射液 6.6mg
生理食塩液 50mL


↓ 15分

- ④ イリノテカン 150mg/m²
5%ブドウ糖液 500mL

↓ 90分

- ⑤ 生理食塩液・・・点滴部位に残っている化学療法剤を押し流します。

- ・ アプレピタントカプセル80mg
化学療法剤投与後2,3日目に内服します。
吐き気がひどい時は4,5日目も内服することがあります。



- ・ デカドロン錠4mg 朝食後に1錠
化学療法剤投与後2,3日目に内服します。



- ・ エスワン配合錠
内服する化学療法剤です。
決められた量、期間(14日)を守って飲んでください。
() mg OD錠を1日 () 錠
朝食後 () 錠
夕食後 () 錠



SIRB療法は3週間を1コースとして1日目に前ページのお薬の点滴を行います。
また、エスワンタイホウというお薬を1日目から2週間毎日飲み、その後休薬します。
これを患者さまの状態に合わせて何コースか繰り返します。

