

SP+HER 療法

～ 治療スケジュール ～

① ソルテム3A500mL×2本・・・プレハイドレーション

↓ **2 時間×2本**

② トラスツブマブ 8mg/kg (初回)、6mg/kg (2回目以降)
生理食塩液 250mL

↓ **90 分 (2回目からは30分)**

③ パロノセトロン静注 0.75mg
デキサメタゾン注射液 4.95mg
生理食塩液 50mL

↓ **15 分**

④ シスプラチン注 60mg/m²
生理食塩液 (全量を500mLに調製)

↓ **120 分**

⑤ ソルアセトF500mL×2本・・・ポストハイドレーション

↓ **2 時間×2本**

終了。

・ エスワンは内服する化学療法剤です。




1日 () 個

{ 朝食後 () 個

{ 夕食後 () 個

決められた量、期間(14日)を守って飲んでください。

SP+HER 療法の投与スケジュール



SP+HER 療法は1日目に点滴を行います。1～14日目までエスワンを内服し1週間休薬します。これを1コース（最短21日）とし、患者さまの状態に合わせて何コースか繰り返します。

1日目

～ 内服薬について～

- アプレピタントカプセル125mg
点滴が始まる1時間以上前に内服



2,3日目

- アプレピタントカプセル80mg
化学療法剤投与後2,3日目に内服します。
(吐き気がひどい時は4,5日目も内服することがあります)



- デカドロン錠4mg
朝食後に1錠
化学療法剤投与後2,3日目に内服します。

