

EB+FOLFIRI 療法

～ 点滴スケジュール ～

1日目

① デキサメタゾン注射液 6.6mg
クロルフェミラミン注 5mg
生理食塩液 50mL

↓ 30分

② 生理食塩液

↓ 30分

③ セツキシマブ 400mg/m² (初回)、250mg/m² (2回目以降)
生理食塩液

↓ 120分 (2回目以降は60分で点滴)

④ パロノセトロン静注 0.75mg
生理食塩液 50mL

↓ 15分

⑤ イリノテカン注 180mg/m²
レボホリナート注 200mg/m²
生理食塩液 500mL

↓ 120分

⑥ 5-FU 400mg/m²
生理食塩液 50mL

↓ 6分


⑦ 5-FU 2400mg/m²
生理食塩液
トレフューザーポンプ・・・1時間で5mLずつ点滴できるように
設計されている医療器具です。

↓ 46時間 (帰宅して継続治療)

3日目

トレフューザーポンプの風船がしぼんだのを確認して針を抜いてください。

EB+FOLFIRI 療法の投与スケジュール



EB+FOLFIRI 療法は
1週間ごとに①～③の点滴を、
2週間ごとに④～⑦の点滴を行います。
これを1コースとし、患者さまの状態に
合わせて何コースか繰り返します。

～ 内服薬について～

1日目

- アプレピタントカプセル125mg
点滴が始まる1時間以上前に内服



2,3日目

- アプレピタントカプセル80mg
化学療法剤投与後2,3日目に内服します。
(吐き気がひどい時は4,5日目も内服することがあります)



- デカドロン錠4mg
朝食後に1錠
化学療法剤投与後2,3日目に内服します。

