【参考資料】　副作用モニタリング（CTCAE　v5.0）

	G1	G2	G3
悪心	摂食習慣に影響のない食欲低下	顕著な体重減少、脱水または栄養失調を伴わない傾向摂取量の減少	カロリーや水分の経口摂取が不十分：経管栄養/TPN/入院を要する
嘔吐	治療を要さない	外来で静脈内輸液を要する;内科的治療を要する	経管栄養/TPN/入院を要する
下痢	ベースラインと比べ<4回/日の排便回数増加	ベースラインと比べ4-6回/日の排便回数増加	ベースラインと比べ7回/日の排便回数増加
便秘	不定期または間欠的な症状;便軟化薬/緩下薬/食事の工夫/浣腸を不定期に使用	緩下薬または浣腸の定期的使用を要する持続的症状	摘便を要する頑固な便秘
口内炎	軽度の症状;治療を要さない	経口摂取に支障がない中等度の疼痛または潰瘍;食事の変更を要する	高度の疼痛;経口摂取に支障がある
ざそう様皮疹	体表面積の<10%を占める紅色丘疹および/または膿疱で、そう痒や圧痛の有無は問わない	体表面積の10-30%を占める紅色丘疹および/または膿疱で、そう痒や圧痛の有無は問わない	体表面積の>30%を占める紅色丘疹および/または膿疱で、中等度または高度の症状を伴う
末梢神経障害		中等度の症状;身の回り以外の日常生活動作の制限	高度の症状;身の回りの日常生活動作の制限
手足症候群	疼痛を伴わない軽微な皮膚の変化または皮膚炎	疼痛を伴う皮膚の変化	疼痛を伴う高度皮膚の変化